

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

_____ E.M.Ağayev

“ ____ ” _____ 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

HERBION sarmaşiq şərbəti

HERBION ivy syrup

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Ivy leaf dry extract (sarmaşiq yarpaqlarının quru ekstraktı)

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 ml şərbətin tərkibində 7 mq sarmaşiq yarpaqlarının (*Hedera helix* L., folium) (5–7,5:1) quru ekstraktı vardır.

Ekstragent: etanol 30% (m/m)

Köməkçi maddələr: duru sorbitol (kristallaşmamış) (E420), qliserin (E422), natrium benzoat (E211), limon turşusunun monohidrat (E330), bədrənc ətrli ətirverici (tərkibində propilenqlikol, etanol, sitronell yağı, sitral ex. Litsea cubeba, limon yağı və keşniş yağı vardır), təmizlənmiş su.

Təsviri

Sarımtıl-qəhvəyi rəngli, spesifik ətri və dadı olan şərbətdir.

Təbii mənşəli substansiyalara xas olan cüzi çöküntü mümkündür.

Farmakoterapevtik qrupu

Soyuqdəymə xəstəliklərində və öskürək zamanı istifadə edilən preparatlar. Bəlgəmgətirici preparatlar (öskürəkəleyhinə preparatlar ilə kombinasiyalar istisna olmaqla).

ATC kodu: R05CA12

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Herbion sarmaşiq şərbətinin tərkibindəki adi sarmaşiq yarpaqlarının quru ekstraktı mukolitik və bronxospazmolitik vasitə kimi təsir göstərir. Preparat bəlgəmin qatılığının azalmasına səbəb olur, bəlgəmin xaric olmasını asanlaşdırır və öskürəyi sakitləşdirir.

İstifadəsinə göstərişlər

Herbion sarmaşiq şərbəti nəmli öskürək zamanı bəlgəmgətirici vasitə kimi istifadə edilir.

Əks göstərişlər

Təsiredici substansiya, araliya fəsiləsindən digər bitkilərə və ya preparatın köməkçi maddələrindən hər hansı birinə qarşı yüksək fərdi həssaslıq.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

4 yaşa qədər uşaqlarda davamedici və ya şiddətli öskürək müalicəyə başlamaz-dan əvvəl diaqnozun müəyyən olunmasını tələb edir.

Əgər müalicədən 7 gün sonra xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmırsa və ya tənəffüsün çətinləşməsi, irinli bəlgəm əmələ gələrsə və ya temperatur yüksələrsə, həkimə müraciət etmək lazımdır. Kodein və ya dekstrometorfan kimi öskürəkəleyhinə vasitələr ilə birgə istifadəsi mütəxəssisin məsləhəti olmadıqda tövsiyə olunmur.

Mədə-bağırsaq traktının şiddətli fazasında xəstəlikləri olan pasiyentlər ehtiyatlı olmalıdır.

Preparatın bəzi inqrediyentləri barədə önəmli məlumat

Herbion sarmaşığı şərbətinin tərkibində sorbitol (E420) vardır. Fruktozaya qarşı nadir irsi dözümsüzlüyü olan xəstələr bu preparatı qəbul etməməlidir.

Preparatın tərkibində bir qədər etanol (spirt) vardır – 1 dozaya - 100mq-dan az.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Bu preparatı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl Siz qəbul etdiyiniz və ya yaxın keçmişdə qəbul edilmiş dərman vasitələr barədə həkimə xəbər verməlisiniz.

Digər dərman vasitələri və qida məhsulları ilə qarşılıqlı təsiri barədə məlumat yoxdur.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hər bir preparatın qəbulundan əvvəl həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsinin təhlükəsizliyi üzrə məlumat az olduğu üçün preparatı bu qrup xəstələrdə istifadə etmək məsləhət görülmür.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatın nəqliyyat vasitələrini və digər mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri barədə məlumat yoxdur.

İstifadə qaydası və dozası

Böyüklər: sutkada üç dəfə 5 ml (1 dozalayıcı qaşığı) şərbət

Məktəbli və yeniyetmə yaşlarında uşaqlar: sutkada iki dəfə 5 ml (bir dozalayıcı qaşığı) şərbət

Məktəbəqədər uşaqlar (1-6 yaş arası): sutkada 2 dəfə 2,5 ml (bir dozalayıcı qaşığının yarısı) şərbət.

1 yaşa qədər uşaqlar: sutkada iki dəfə 2,5 ml (bir dozalayıcı qaşığının yarısı) şərbət (yalnız həkim təyinatı ilə).

Herbion sarmaşığı şərbəti qida qəbulundan asılı olmayaraq istifadə edilir.

Dərmanın üstündən kifayət qədər ılıq su və ya çay içmək lazımdır.

Müalicə müddəti – 1 həftədən az olmayaraq. Əgər şərbətin qəbulundan sonra 1 həftə ərzində simptomlar saxlanılarsa, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Doza qəbulu unudularsa

Unudulmuş dozanı əvəz etmək üçün iqiqat doza qəbul etmək olmaz. Müalicə növbəti dozanı vaxtında qəbul etməklə davam etdirilir.

Əlavə təsiri

Digər dərman vasitələr kimi ,Herbion sarmaşığı şərbəti tək-tək hallarda əlavə təsirlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər.

Tez-tez ($\geq 1/100$ - $< 1/10$):

- ürəkbulanma, qusma, diareya.

Bəzən ($\geq 1/1000$ - $< 1/100$):

-övrə, dəri səpgisi, kuperoz və ya tənəffüsün çətinləşməsi şəklində özünü büruzə verən allergik reaksiyalar, anafilaktik reaksiyalar.

Allergik reaksiyalar əmələ gələrsə, preparatın qəbulunu ləğv edib, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Bu içlik vərəqədə qeyd olunmayan əlavə təsirlər meydana çıxarsa, lütfən, müalicə həkiminizə bu barədə məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Tövsiyə olunduğundan artıq doza qəbul etmək olmaz.

Simptomları: sutkalıq dozadan 2 dəfə artıq doza qəbul etdikdə ürəkbulanma, qusma, diareya, oyanıqlıq halları mümkündür.

Müalicəsi: simptomatik.

Buraxılış forması

150 ml şərbət, plastik qapaqlı şüşə flakonda. 1 flakon dozalayıcı qaşığıla və içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

Xüsusi saxlanma şəraiti tələb olunmur.

Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Flakon açıldıqdan sonra şərbəti 3 ay ərzində istifadə etmək lazımdır.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveniya.

Azərbaycanda Nümayəndəlik

Xocalı Prospekti 55, AGA Biznes Mərkəzi

Tel.: (+99412) 464 40 22/23; (+99450) 264 29 27