

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

_____ E.M.Ağayev

“ _____ ” _____ 2021-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PIKOVIT şərbət
PIKOVIT®

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Multivitamins

Tərkibi

5 ml (1 qaşığı) şərbətin tərkibində əldir:

Təsiredici maddələr:

Retinol palmitat 1,7 MME/q (vitamin A)	900 BV
Xolekalsiferol 1MME/q (vitamin D ₃)	100 BV
Askorbin turşusu (vitamin C)	50,00 mq
Tiamin hidroxlorid (vitamin B ₁)	1,00 mq
Riboflavin natrium fosfat (vitamin B ₂)	1,00 mq
Piridoksin hidroxlorid (vitamin B ₆)	0,60 mq
Sianakobalamin (vitamin B ₁₂)	1,00 mkq
Nikotinamid (vitamin PP)	5,00 mq
Dekspantenol (D-pantenol)	2,00 mq

Köməkçi maddələr: aqar, traqakant kitrəsi, saxaroza, duru dekstroza (qlükoza), portağal yağı aromatizatoru, portağal aromatizatoru, qreypfrut aromatizatoru, polisorbət 80, limon turşusu monohidratı, al-qırmızı boya [Ponceau 4R] (E124), natrium-benzoat, təmizlənmiş su.

Təsviri

Şərbət qatı, yapışkana bənzər, açıq sarıdan qəhvəyimtil-narıncı rəngə qədər, azacıq gözə çarpan hissəcikli mayedir. Xoş qoxu və turş dada malikdir.

Farmakoterapevtik xassələri

Polivitamin vasitə.

ATC kodu: A11BA.

Farmakoloji xassələri

Farmakodinamikası

Pikovit şərbətinin tərkibində vitamin kompleksi vardır, hansılar ki, orqanizmdə normal boyatma və inkişaf üçün, sağlamlığın saxlanması və möhkəmləndirilməsi üçün zəruri olan metabolik proseslərin mühüm faktorlarıdır.

Vitamin A uşaq orqanizminin hüceyrələrinin böyüməsini və yetişməsini tənzimləyir, həmçinin antioksidant müdafiənin komponentidir, hüceyrə membranının quruluşuna daxildir, dərinin və selikli qişaların müdafiəsi üçün vacibdir, görmənin fotokimyəvi aktında iştirak edir, hüceyrə immuniteti reaksiyasını stimullaşdırır.

Vitamin D₃ orqanizmdə kalsium və fosfor balansının saxlanması mühüm rol oynayır. Onun çatışmazlığı zamanı sümük toxumasında kalsiumun miqdarı azalır, raxit inkişaf edir.

Vitamin B₁ karbohidrat mübadiləsini təmin edir, sinir sisteminin normal fəaliyyətinə səbəb olur.

Vitamin B₂ toxumaların, o cümlədən dəri hüceyrələrinin regenerasiya proseslərinə kömək edir.

Vitamin B₆ zülal, karbohidrat və yağ mübadiləsində iştirak edir, hemoqlobinin, həmçinin qalxanabənzər vəzi hormonlarının əmələ gəlməsində iştirak edir, sümüklərin, dişlərin, dişətinin quruluşunun və funksiyalarının saxlanmasına səbəb olur.

Vitamin B₁₂ qanyaranma proseslərində iştirak edir, sinir sisteminin normal fəaliyyət göstərməsinə səbəb olur.

Vitamin C əsas vitamin-antioksidantdır, dəmirin bağırsaqdan sorulmasında iştirak edir, birləşdirici toxumada mübadiləni tənzimləyir, damarların keçiriciliyini normallaşdırır, toksinlərin zərərsizləşdirilməsində aktiv iştirak edir, orqanizmin infeksiyalara qarşı davamlılığını yüksəldir, iltihabi reaksiyaları zəiflədir.

Nikotinamid toxumalarda metabolik prosesləri aktivləşdirir, regenerasiya proseslərinin gedişini yaxşılaşdırır, steroid hormonların sintezində iştirak edir.

D-pantenol zülal metabolizmində, yağ turşularının və xolesterinin sintezində, enerji hasilində iştirak edir, bağırsaq biosenozunun mühüm komponenti olan bifidobakteriyaların artmasına kömək edir.

Farmakokinetikası

Pikovit şərbəti haqqında farmakokinetik məlumat yoxdur. Orqanizmdəki bəzi vitaminlərin funksiyaları məlumdur və ədəbiyyatda təsvir olunur.

Suda həll olan vitaminlər (B vitaminləri, C vitamini və nikotinamid) gündəlik tələbatı ödəmək üçün lazım olan miqdarda çox yaxşı sorulur. Artıq miqdar sidiklə, bəzi hallarda isə nəcislə də xaric olur. Bu vitaminlər bədəndə məhdud miqdarda saxlanılır, buna görə də onların müntəzəm qəbulu toxumalarda kifayət qədər konsentrasiyanı qorumaq üçün lazımdır. Yağların iştirakı ilə, yağda həll olunan A və D vitaminləri, peroral qəbul edildikdə, nazik bağırsaqda yaxşı sovrulur.

İstifadəsinə göstərişlər

Pikovit şərbəti normal qidalanmanı əvəz etmir.

Pikovit şərbəti uşaqlar üçün profilaktik məqsədlə nəzərdə tutulmuşdur:

- iştaha olmayan zamanı;
- orqanizmin infeksiya və soyuqdəymə xəstəliklərinə qarşı müqavimətini yüksəltmək üçün;
- keçirilmiş xəstəliklərdən sonra sağalma dövründə;
- fiziki inkişaf kifayət qədər olmayan zaman (boyatmanın gecikməsi);
- xüsusilə, qış və yaz mövsümlərində, gündəlik rasionda vitamin qismində;
- məktəb yaşlı uşaqlarda yüksək fiziki və sinir-psixi yüklənmə zamanı;
- antibiotiklərdən istifadə zamanı kompleks müalicənin tərkibində.

Əks göstərişlər

Preparatın tərkibindəki maddələrə qarşı yüksək həssaslıq.

Şəkərli diabet (5 ml Pikovit şərbətinin tərkibində 3 q şəkər vardır).

A və D hipervitaminozu.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Pikovit şərbətini 1 yaşa qədər uşaqlara vermək tövsiyə olunmur.

Hər hansı hiperhəssaslıq reaksiyası zamanı preparatın qəbulu dayandırılmalıdır.

Sidiyin sarı rəngə boyana bilməsi tamamilə zərərsizdir və şərbətin tərkibində riboflavinin olması ilə izah olunur.

Pikoviti tərkibində vitaminlər olan preparatlarla qəbul etmək tövsiyə olunmur.

Xəbərdarlıq: Xəstəlik zamanı və ya dərman qəbulu periodunda istifadədən öncə həkimlə məsləhətləşin.

5ml Pikovit şərbətinin tərkibində 3,3 q saxaroza, 0,7 q qlükoza vardır, buna görə də anadangəlmə kəskin qlükoza və fruktoza keçirməzliyi, qlükoza/qalaktoza malabsorbsiya sindromu və saxaroza/izomaltoza çatışmazlığı olan uşaqlara tövsiyə olunmur. Preparatın tərkibində azorəngləyici E124 vardır, hansı ki, allergik reaksiyalar yarada bilər.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Vitamin C sulfanilamidlər qrupundan olan antimikrob vasitələrin təsirini və əlavə effektlərini (o

cümlədən sidikdə kristalların meydana çıxması) gücləndirir.

Uyuşmazlığı

Tətbiq edilməyib.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamilə qadınlara və süd verən analara vitaminləri həkim məsləhəti ilə qəbul etmək gərəkdir. Şərbətdəki vitamin dozaları uşaqlar üçün məsləhət görülüb.

Nəqliyyat vasitəsinə və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatın nəqliyyat vasitələrinin və mexanizmlərin idarəedilməsinə təsiri haqqında məlumat yoxdur. Preparat uşaqların hərəkət funksiyasına təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Preparat daxilə qəbul olunur.

İstifadə etməzdən əvvəl şərbəti çalxalamaq lazımdır.

1 yaşdan 3 yaşa qədər uşaqlar: gündə 2 dəfə 1 dozalayıcı və ya çay qaşığı (5 ml) şərbət tövsiyə olunur.

4 yaşdan 6 yaşa qədər uşaqlar: gündə 3 dəfə 1 dozalayıcı və ya çay qaşığı (5ml).

7 yaşdan 14 yaşa qədər uşaqlar: gündə 3-4 dəfə 1 dozalayıcı və ya çay qaşığı (5ml).

Şərbəti çay, şirə və ya meyvə püresi ilə qarışdıraraq və ya qaşığı vasitəsilə vermək olar.

Kifayət qədər iştaha olmadıqda şərbəti 1 ay müddətində hər gün vermək lazımdır.

Təkrar kurs 1-3 aydan sonra və ya həkim məsləhəti ilə.

Doza həddinin aşılması

Tövsiyə olunan dozalarda qəbul zamanı intoksikasiya gözlənilmir.

Yüksək dozalarda qəbul A və D hipervitaminozuna səbəb ola bilər, amma doza həddinin aşılması az ehtimal olunandır.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar mümkündür. Tövsiyə olunan gündəlik dozanı artırmayın, təsadüfən yüksək dozaların qəbulu zamanı dərhal həkimə müraciət edin.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Flakon açıldıqdan sonra 2 ay ərzində istifadəyə yararlıdır.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda saxlamaq lazımdır. Işıqdan qorumaq üçün orijinal bağlamada saxlamaq lazımdır.

Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Buraxılış forması

Şərbət.

Şüşə flakon (Ph. Eur. III tip) plastik qapaqlı, plastik dozalayıcı qaşığı: 150ml şərbət, karton qutuda.

Buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveniya

Smarjeska c. 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Azərbaycanda Nümayəndəlik

Xocalı Prospekti 55, AGA Biznes Mərkəzi.

Tel.: (+99412) 464 40 22/23; (+99450) 264 29 27.